



OZIMA PŠENICA

Tehnologija ishrane

Šta je najvažnije da znamo?

- Pažnju treba posvetiti odgovarajućem odnosu azot/ fosfor. U fazama rasta i razvika treba da je 2:1.
- U jesen se unosi sva potrebna količina fosfora i kalijuma, a azot u količini od 40-50 kg/ha.
- Prvo prihranjivanje pšenice se preporučuje već u kasnu zimu ili rano proleće.
- Pšenica se uglavnom, prihranjuje dva puta, tri prihrane su retke i zavise od stanja useva i uslova gajenja.
- Prva prihrana utiče na visinu prinosa, a druga na kvalitet.
- Folijarna prihrana se može izvoditi u jesen i proleće.
- Za visok prinos i kvalitet, osim osnovnih hraniva treba obezbediti i odgovarajući nivo mikroelemenata.

Koje đubrivo da koristimo?

Osnovno đubrenje:

Upotrebljavajte Yara Mila™ đubriva, složena, mineralna, kompleksna, granulirana đubriva sa mikroelementima za ishranu ratarskih kultura. Ukoliko imate rezultate hemijske analize zemljišta, odaberite odgovarajuću kombinaciju za Vašu parcelu. Ukoliko niste radili analizu zemljišta, primenite đubrivo sa standardnim odnosom hraniva za usev pšenice, ili sa povišenim sadržajem fosfora.

Prihrana:

Ukoliko niste izvršili osnovno đubrenje u jesen, za prvu prihranu u proleće koristite kompleksna NPK đubriva sa povišenim sadržajem azota. U uobičajenoj prihrani koristite azotna đubriva KAN ili AN, a na bazi pH-hemijske reakcije zemljišta.

Folijarno đubrenje:

- Za opšte zadovoljenje potreba useva koristite Folicare™ kristalna, vodotopiva đubriva.
- Za specifične potrebe i otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata (nedostatak u zemljištu ili nemogućnost usvajanja), koristite YaraVita™ tečna folijarna đubriva sa sadržajem samo jednog ili sa više mikroelemenata, kao što je YaraVita™ Gramitrel.



Kada primenjujemo đubrivo?

- Osnovno đubrenje: Vršiti u jesen u pripremi zemljišta za setvu.
- Prihrana: Prva prihrana što ranije, već krajem zime ili u rano proleće kada to vremenski uslovi dozvole. Po pravilima ne vrši se pre 15. februara. Druga prihrana je u fazi intenzivnog rasta stabla do pojave klasa. Treća, ukoliko je potrebna, u vreme klasanja.
- Folijarna prihrana: U jesen, ako tretirate usev pesticidima. Proletnje folijarne prihrane se vrše u fazi bokorenja i lista zastavičara.





Preporučena tehnologija

Osnovno đubrenje u jesen:

Zemljišta sa srednjim sadržajem fosfora: YaraMila™ 8-24-24, doza: 250-350 kg/ha.

Količina čistog azota treba da je 40-50 kg/ha u jesenjem delu vegetacije.

Folijarna prihrana u jesen:

Folicare™ 19-11-24 Cu, 3-5 kg/ha ili YaraVita™ Gramitrel, 2-4 l/ha (1,5 % max. koncentracija).

U prihranama treba dodati oko 100 kg/ha azota. Preporučeno je uraditi N-min metodu radi određivanja tačne količine.

Prva prihrana pšenice:

40-60 kg/ha čistog azota.

Druga prihrana pšenice:

30-40 kg/ha čistog azota.

Treća prihrana pšenice:

20-30 kg/ha čistog azota.

Folijarna prihrana u proleće:

- Za opšte kondicioniranje: Folicare™ 19-11-24 Cu, 3-5 kg/ha, u max. koncentraciji do 1,5%.
- Za ciljani folijarni tretman: YaraVita™ Gramitrel 2-4 l/ha ili YaraVita™ Coptac 0,25-0,5 l/ha, uz dodatak YaraVita™ Thiotrac 2-3 l/ha.

Preporučeni proizvodi:

Naziv proizvoda	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Fe	Mn	Zn
YaraMila™	8	24	24	2	5	0,05	0,05	0,1	0,02*

Hemijski sastav u %

*EDTA helatni oblik

Preporučeno folijarno đubrivo sa više mikroelemenata:

Naziv proizvoda	N	MgO	Cu	Mn	Zn
	g/l				
Yara Vita™ Gramitrel	61	260	50	130	80

Preporučena folijarna đubriva sa jednim mikroelementom:

Naziv proizvoda	N	S	Cu
	g/l		
Yara Vita™ Coptac			500
Yara Vita™ Thiotrac	200	300	

Napomena: YaraVita™ Coptac sadrži bakar, važan element za pšenicu u postizanju visokih prinosa. YaraVita™ Thiotrac sadrži azot i sumpor za bolji kvalitet.

Naziv proizvoda	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Cu	Fe	Mn	Zn
Folicare™	19	11	24	2	3,8	0,025	0,15	0,18	0,1	0,015


Hemijski sastav u %





Preporučena tehnologija

OZIMA PŠENICA

					
					
	Osnovno đubrenje pre setve	Jesenja folijarna prihrana, uz pesticide	Prva proletnja prihrana u fazi bokorenja	Druga folijarna prihrana u fazi rasta stabla do zastavičara	Treća prihrana (ukoliko je potrebna) u fazi klasanja
YaraMila™	8-24-24 250-350 kg/ha				
YaraVita™		Gramitrel 2-4 l/ha	Gramitrel 2-4 l/ha, Coptrac 0,25-0,5 l/ha, Thiotrac 2-3 l/ha		
Folicare™		ili 19-11-24 Cu, 3-5 kg/ha			
	40-50 kg/ha Čistog azota		40-60 kg/ha Čistog azota	30-40 kg/ha Čistog azota	20-30 kg/ha Čistog azota
Granulisana đubriva Folijarna đubriva					

www.yara.rs





www.yara.rs

Stručni saveti, prodaja, marketing:

Stevan Mesarović, dipl. ing. agro

+387 65 921 189

stevan.mesarovic@yara.com

Logistika, marketing:

Vini Dozet

+36 30 242 7257

vini.dozet@yara.com



Imajte u vidu!

Pre primene Folicare™ i YaraVita™ folijarnih đubriva napraviti test mešanja sa pesticidima. Za više informacija posetite veb-stranicu www.tankmix.com.

Gore preporučene tehnologije su za opštu namenu, optimalna primena je moguća po analizi zemljišta. Ukoliko nemate potrebne analize, biće nam čast da se obratite za savet i da Vam pomognemo.

Navedene tehnologije su intelektualna svojina Yara Hungária Kft. Preštampavanje, kopiranje i upotreba podataka je moguća samo uz dozvolu Yara Hungária Kft.

Proizvodnja: April 2009.

