



ULJANA REPICA

Tehnologija ishrane

Šta je najvažnije da znamo?

- Uljana repica je usev sa specifičnim zahtevima za hranivima i za postizanje visokih prinosa i iskorišćenje potencijala, preporučeno je primeniti metodu obračuna potrebnih količina hraniva za date uslove.
- Jedna od najvećih grešaka koju pravimo u jesen je primena previsoke doze azota. Optimalna količina čistog azota u jesen je do 25-35 kg/ha. Tom količinom azota, uljana repica prezimljava u optimalnoj fazi razvoja 8-11 listova. Veća količina prouzrokuje bujnost i manju otpornost na mrazeve.
- Kalijum je izuzetno važan za otpornost na zimske uslove, a fosfor za razvoj korenovog sistema.
- Pored azota, fosfora i kalijuma važnu ulogu za prinos i kvalitet repice imaju optimalne količine sumpora, bora, magnezijuma i mangana.

- Folijarna prihrana ne sme da izostane iz tehnologije, posebno za preventivno otklanjanje nedostataka hranljivih elemenata, otpornost na mrazeve, kao i za postizanje većeg prinosa i kvaliteta (sadržaj ulja itd.)

Koja đubriva da koristimo?

Osnovno i startno đubrenje:

Upotrebljavajte Yara Mila™ đubriva, složena, mineralna, kompleksna, granulirana đubriva sa mikroelementima za ishranu ratarskih kultura. Ukoliko imate rezultate hemijske analize zemljišta, odaberite odgovarajuću kombinaciju za Vašu parcelu. Ukoliko niste radili analizu zemljišta, primenite đubrivo sa standardnim odnosom hraniva za usev uljane repice radi zadovoljenja potreba useva za hranivima, posebno kalijumom.



Prihranjivanje:

Odaberite odgovarajuće azotno đubrivo na bazi pH (hemijske reakcije zemljišta). Amonijum nitrat-AN ili krečni amonijum nitrat KAN.

Folijarno đubrenje:

- Za opšte zadovoljenje potreba useva koristite Folicare™ kristalna, vodotopiva đubriva.
- Za specifične potrebe i otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata (nedostatak u zemljištu ili nemogućnost usvajanja), koristite YaraVita™ tečna folijarna đubriva sa sadržajem jednog ili više mikroelemenata, kao što je YaraVita™ Brassitel.

Kada primenjujemo đubrivo?

- Osnovno đubrenje: Obaviti u pripremi zemljišta pre setve.
- Prihrana useva: Prvu prihranu vršiti odmah nakon zime, a drugu u fazi kada su pupoljci formirani.
- Folijarna prihrana (zajedno sa pesticidima): Prva primena u jesen ako se primenjuju regulator ili zaštitna sredstva. Prva prolećna folijarna prihrana se vrši sa početkom vegetacije, a druga, zavisno od klirensa prskalice, može se raditi do pred cvetanje.





Preporučena tehnologija

Osnovno đubrenje:

- Zemljišta sa dobrim nivoom snabdevenosti:
YaraMila™ 8-24-24, YaraMila™ 8-20-30, YaraMila™ 8-12-25, doza: 200-300 kg/ha.
- Zemljišta srednje snabdevena hranivima: YaraMila™ 8-24-24, YaraMila™ 8-20-30, YaraMila™ 8-12-25, YaraMila™ 7-10-32, doza: 250-400 kg/ha.
- Zemljišta slabo snabdevena hranivima: YaraMila™ 8-24-24, YaraMila™ 8-20-30, YaraMila™ 7-10-32, YaraMila™ 8-12-25, doza: 300-450 kg/ha.

Prihrana uljane repice:

(ukupna količina azota je 120-140 kg/ha):
Prihrana u rano proleće:
70-100 kg/ha čistog azota
Prihrana pred cvetanje:
primeniti 20-40 kg/ha čistog azota

Folijarna ishrana se može vršiti u jesen i u proleće:

- Za opštu primenu u jesen i proleće:
Folicare™ 17-9-33 B, 3-5 kg/ha, max. koncentracija 1,5%.
- Za ciljane folijarne tretmane:
YaraMila™ Brassitrel 3 kg/ha i u jesen i u proleće. YaraMila™ Bortrac 3 l/ha, YaraMila™ Mantrac 1-1,5 l/ha, YaraMila™ Thiotrac 5 l/ha, YaraMila™ Magtrac 2-4 l/ha u proleće.

Preporučeni proizvodi:

Naziv proizvoda	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Fe	Mn	Zn
YaraMila™	7	10	32	2	5	0,1	0,05	0,1	0,05
YaraMila™	8	12	25	3,2	8	0,05	-	0,2	0,02
YaraMila™	8	24	24	2	5	0,05	0,05	0,1	0,02*
YaraMila™	8	20	30	-	-	0,05	0,05	0,1	0,02*

Hemijski sastav u %
*EDTA helatni oblik

Preporučena folijarna đubriva sa više mikroelemenata:

Naziv proizvoda	B	Mn	Mo	Mg	S
	%				
Yara Vita™ Brassitrel	8,0	7,0	0,4	5,0	11,5

Preporučena folijarna đubriva sa jednim mikroelementom:

Naziv proizvoda	B	Mn	MgO	N	S
	g/l				
Yara Vita™ Boron	150				
Yara Vita™ Mantrac		500			
Yara Vita™ Magtrac			500		
Yara Vita™ Thiotrac				200	300

Naziv proizvoda	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Folicare™	17	9	33	2	5	0,2	0,02	0,05	0,05	0,002	0,03

Hemijski sastav u %



ULJANA REPICA






www.yara.rs

Stručni saveti, prodaja, marketing:

Stevan Mesarović, dipl. ing. agro
+387 65 921 189
stevan.mesarovic@yara.com

Logistika, marketing:

Vini Dozet
+36 30 242 7257
vini.dozet@yara.com



Imajte u vidu!

Pre primene Folicare™ i YaraVita™ folijarnih đubriva napraviti test mešanja sa pesticidima. Za više informacija posetite veb-stranicu www.tankmix.com.

Gore preporučene tehnologije su za opštu namenu, optimalna primena je moguća po analizi zemljišta. Ukoliko nemate potrebne analize, biće nam čast da se obratite za savet i da Vam pomognemo.

Navedene tehnologije su intelektualna svojina Yara Hungária Kft. Preštampavanje, kopiranje i upotreba podataka je moguća samo uz dozvolu Yara Hungária Kft.

Proizvodnja: April 2009.

