



ŠEĆERNA REPA

TEHNOLOGIJA ISHRANE ŠEĆERNE REPE

Šećerna repa ima velike zahteve za hranljivim materijama: 20-70 kg/ha azota, 100-120 kg/ha fosfora i 150-220 kg/ha kalijuma. Kalcijum utiče sadržaj šećera u repi i olakšava njenu preradu. Upotrebom osnovnih **YaraMila™** đubriva može se obezbediti jedan deo potreba šećerne repe za mikroelementima, dok se preostali deo može nadoknaditi folijarnom prihranom. Od mikroelemenata za šećernu repu treba istaći važnost bora (B), jer se, usled nedostatka, javljaju smetnje kod razvoja korenovog sistema, kao i suva trulež srca šećerne repe. Nedostatak bora možemo prepoznati po debljini listova. Najmlađi listovi su krutog držanja i u početku tamnozeleno boje, a kasnije odumru. Kod manjeg nedostatka dolazi do oštećenja korena repe i povećava se mogućnost razvoja bakterija, gljivica i raznih bolesti.

Osnovno đubrenje


Obaviti u jesen pod osnovnu obradu ili u proleće prilikom pripreme zemljišta pre setve. U slučaju siromašnog zemljišta, odnosno kada je potrebno uneti veće količine hraniva, preporučuje se unošenje đubriva u više navrata. Jedan deo (2/3) se unosi u jesen, jer samo tako je osigurano da duboko ukorenjena repa može usvojiti hranljive materije, dok se ostatak đubriva (1/3) dodaje u proleće prilikom setve. Upotrebljavajte Yara Mila™ đubriva (**YaraMila™13-13-21**) u dozi 250-600 kg/ha. To su složena, mineralna, kompleksna, granulirana đubriva sa mikroelementima.

Prihrana useva

Azotom se usev prihranjuje u proleće. Obavlja se tokom kultivacije u istom prohod. Potrebno je voditi računa o količini unetog azota jer nedovoljna količina smanjuje prinos, a kada je količina azota prevelika (preko 40 kg/ha) mogu se pojaviti problemi u kvalitetu.

Folijarno đubrenje

Folijarne tretmane provoditi zajedno sa zaštitom useva pesticidima. Da bi zadovoljili potrebe useva i otklonili simptome nedostataka pojedinih elemenata i za poboljšanje kvaliteta i povećanje digestije, koristite **Ferticare™** kristalna, vodotopiva đubriva, 3-5 kg/ha, u koncentraciji do 1,5%.



	Osnovno đubrenje	Prva folijarna prihrana	Prihrana azotnim đubrivima	Druga folijarna prihrana	Treća folijarna prihrana
YaraMila™	250-600 kg/ha*				
	30-60 kg/ha** čistog azota		30-40 kg/ha** čistog azota		
Ferticare™		3-5 kg/ha		3-5 kg/ha	3-5 kg/ha

*U slučaju đubrenja organskim đubrivom količine P i K smanjujemo za 20-30%.

**Kod određivanja potrebnih količina azota (N) uzeti u obzir sadržaj u kompleksnim đubrivima. Ako je predusev leguminoza, smanjiti količinu azota.

